

GRUPO POBLACIONAL	NUEVA PAUTA	
	Sin vacuna previa	Con vacuna previa (al menos una dosis de VNP23)
60 y más años sin factor de riesgo.	VNC13	
Adultos (15 y más años) con patología crónica de base.	VNC13	VNC13 (intervalo 1 año)
Personas de cualquier edad y de alto riesgo.	VNC13 + VNP23 (intervalo 8 sem) + Revacunación a los 5 años con VNP23	VNC13 (intervalo 1 año) + Revacunación a los 5 años con VNP23


VACUNACIÓN ANTINEUMOCÓCICA DEL ADULTO

LO QUE NECESITAS SABER



SEMG Madrid
Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia





IMPORTANCIA DE PREVENIR LA NEUMONIA NEUMOCÓCICA EN EL ADULTO:

La neumonía es un proceso inflamatorio agudo del parénquima pulmonar de origen infeccioso. En nuestro medio, el principal causante de la NAC es **Streptococcus pneumoniae**.

La incidencia de hospitalización por NAC aumenta con la edad, alcanzándose tasas en España de 1.400 casos por 100.000 habitantes en mayores de 65 años y de 463 casos por 100.000 hab entre 18 y 65 años, alcanzando 10.222 muertes en 2017.

La presencia de enfermedades crónicas subyacentes aumentan el riesgo y la mala evolución de la neumonía. Entre las cuales el hábito tabáquico, la exposición a factores ambientales, la desnutrición, neumonías previas, enfermedad crónica pulmonar (asma, EPOC), diabetes, cardiopatías, mala salud dental, tratamientos con inmunosupresores, corticosteroides orales o inhibidores de la secreción gástrica, además de otras enfermedades crónicas como las cardíacas, hepáticas, renales, diabetes mellitus, inmunodeficiencia o inmunodepresión, asplenia anatómica o funcional o el implante coclear ■



PREGUNTAS FRECUENTES:

1. Actualmente la recomendación de vacunación antineumocócica en personas inmunocompetentes pero con una enfermedad crónica asociada de tipo respiratorio, cardíaco o una diabetes, debe ser:

Solo una dosis de la vacuna conjugada 13v.

2. ¿Cuándo se puede poner la VNC13?

En cualquier momento, no es estacional.

3. Se pueden poner la vacuna de la gripe y la vacuna antineumocócica conjugada 13V a la vez?

Sí, preferiblemente en regiones anatómicas distintas.

4. Hay que re-vacunar frente a neumococo con la vacuna conjugada 13-valente?

No se ha establecido que sea necesaria ninguna dosis de recuerdo.

5. En un adulto que ya ha padecido una neumonía ¿está indicada la vacunación frente a neumococo?

Sí, porque el germen etiológico más frecuente en las NAC es el neumococo. La neumonía neumocócica previa es un factor de riesgo importante de nueva NAC. , porque ya ha demostrado que es vulnerable y tiene más riesgo que la población general.

6. Actualmente la recomendación de vacunación antineumocócica en personas inmunodeprimidas debe ser:

Una pauta secuencial de vacuna conjugada 13v seguida de una vacuna polisacáridica 23v con un intervalo mínimo de 8 semanas.